



EURO-peristat 2019



*Perinatale sterfte is hier weergegeven als het totaal van de foetale sterfte (bij een zwangerschapsduur vanaf 28+0 weken) en de neonatale sterfte (bij levendgeborene met een zwangerschapsduur vanaf 24+0 weken tot 28 dagen na de geboorte).



Perinatale sterfte



3,2/1000

tijdens
zwangerschap
of bevalling
foetaal

1,7/1000

t/m 28 dagen
na geboorte
neonataal


5,0/1000

perinatale
sterfte
foetaal + neonataal


* in 2021 kent de neonatale sterfte, en daarmee ook de perinatale sterfte, onderregistratie. Dit is veroorzaakt door aanleverproblemen vanuit de Verloskundige Informatiesystemen en het opschorten van de registratie door algemene kinderartsen




Foetale sterfte – driejaarstrend




Pijnbestrijding - epiduraal



Hyperbilirubinemie bij pasgeborenen > 35 weken





Hersenbeschadiging t.g.v. ernstige hyperbilirubinemie (kernicterus) komt nog steeds voor en is vermijdbaar

Voorkom ernstige hyperbilirubinemie bij pasgeborenen:

Bij geelzien <24 uur: direct verwijzing naar kinderarts

Bij verhoogde voorafkans: frequente controle en bilirubine bepalen

Reageer op (telefonische) meldingen

Bij twijfel: prikken


Maak afspraken over terugkoppeling uitslagen in 1^e en 2^e lijn



 Verloskundige praktijk




 Perined



  Mijn Perined





Complexiteit → teveel vertalingen